VECTORES

PARALELOS Y PERPENDICULARES

Universidad
Tecnológica
del Perú

LOGRO DE SESIÓN

Al finalizar la sesión de aprendizaje el alumno reconoce vectores paralelos y perpendiculares. Aplica e interpreta el concepto del operador “*ortogonal del vector*” y del producto escalar para reconocer la Perpendicularidad.

Universidad
Tecnológica
del Perú

VECTORES

**VECTOR
PARALELO**

**VECTOR
ORTOGONAL**

PARALELISMO DE VECTORES

Dos vectores Paralelos se representan como: $\vec{a} \parallel \vec{b}$

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \quad \Rightarrow \quad \vec{a} = k \cdot \vec{b} \quad (k \text{ es un escalar})$$

Si un escalar multiplicado por un vector $\vec{a}$ da el vector $\vec{b}$ entonces ambos vectores son paralelos.

El concepto del módulo de un vector y el reconocimiento del paralelismo genera un teorema de gran aplicación para la física.

$$\text{Teorema: } \vec{a} \parallel \vec{b} \Rightarrow \frac{\vec{a}}{\|\vec{a}\|} = \frac{\vec{b}}{\|\vec{b}\|}$$

Si dos vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$ son paralelos entonces **sus vectores unitarios son iguales.**

¿son paralelos $\vec{a} = (2, -3)$; $\vec{b} = (4, -6)$?

$$\vec{b} = k \cdot \vec{a} \Rightarrow (4, -6) = k \cdot (2, -3)$$

$$k = 2 \Rightarrow \vec{a} \parallel \vec{b}$$

Observe que el
Teorema se
cumple

$$\vec{a} = \frac{(2, -3)}{\|\vec{a}\|} = \left(\frac{2}{\sqrt{13}}, \frac{-3}{\sqrt{13}} \right)$$

$$\vec{b} = \frac{(4, -6)}{\|\vec{b}\|} = \left(\frac{4}{\sqrt{52}}, \frac{-6}{\sqrt{52}} \right) = \left(\frac{4}{2\sqrt{13}}, \frac{-6}{2\sqrt{13}} \right) = \left(\frac{2}{\sqrt{13}}, \frac{-3}{\sqrt{13}} \right)$$

EJERCICIOS

Dados los vectores $\vec{m} = (-1,2)$ y $\vec{n} = (3,6)$ ¿son paralelos? ¿Se cumple el Teorema?

solución Probando el Paralelismo: $(-1,2) = k \cdot (3,-6)$

Sí, $k = -\frac{1}{3}$, son iguales por lo tanto son paralelos

Convirtiéndolos a unitarios:

$$\vec{m} = \frac{(-1,2)}{\|\vec{m}\|} = \left(\frac{-1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}} \right)$$

$$\vec{n} = \frac{(3,-6)}{\|\vec{n}\|} = \left(\frac{3}{\sqrt{45}}, \frac{-6}{\sqrt{45}} \right) = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}} \right)$$

No son iguales por lo tanto el Teorema no se cumple

Si queremos aplicar el Teorema debemos tener cuidado al tomar los vectores en un mismo sentido

EJERCICIO APLICATIVO

Se tiene un segmento $\overline{PQ}$ con extremos $P = (3,7)$ y $Q = (15,11)$; si, se quiere dividir en dos partes iguales. Halle las coordenadas del punto medio.

Solución:

El mismo
sentido

$$\overline{PQ} \parallel \overline{Pm} \Rightarrow \frac{\overline{PQ}}{|\overline{PQ}|} = \frac{\overline{Pm}}{|\overline{Pm}|} \Rightarrow \frac{Q - P}{2x} = \frac{m - P}{x} \Rightarrow \frac{(12,4)}{2} = \frac{m - (3,7)}{1}$$

$$\Rightarrow (6,2) = m - (3,7) \Rightarrow (6,2) + (3,7) = m \Rightarrow (9,9) = m$$

¿Si sumamos los extremos y lo dividimos entre dos?

$$\frac{P + Q}{2} \Rightarrow \frac{(18,18)}{2} \Rightarrow (9,9) = m$$

Producto escalar o interno de vectores

Dados dos vectores $\vec{u} = (a, b)$ y $\vec{v} = (c, d)$, el producto escalar o Interno de $\vec{u}$ y $\vec{v}$ se define así:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (a, b) \cdot (c, d) = a \cdot c + b \cdot d$$

Ejemplo: Dados los vectores: $\vec{u} = (4, 3)$ y $\vec{v} = (-2, 7)$. Calcula $\vec{u} \cdot \vec{v}$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (4, 3) \cdot (-2, 7) = (4)(-2) + (3)(7) = 13$$

$$\therefore \vec{u} \cdot \vec{v} = 13$$

Notamos que, el producto interno o escalar de los vectores es un número

OPERADOR ORTOGONAL

El operador ortogonal tiene la función de hacer girar al vector 90° en sentido antihorario.

Sea $\vec{b} = (2,6)$ entonces $\vec{b}^\perp = (-6,2)$

VECTORES PERPENDICULARES

Definición:

Dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$, son perpendiculares si y solo si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

$$Si: \vec{u} \perp \vec{v} \leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

Decir Perpendiculares implica a decir que entre ellos el ángulo es de 90° .

Propiedades

$$1. \vec{u} \perp \vec{v} \leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

$$2. \vec{u} \perp \vec{v} \leftrightarrow \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$$

$$3. \vec{u} \perp \vec{v} \leftrightarrow \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$$

$$4. \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u} + \vec{v}\|^2$$

Teorema
de
Pitágoras

ÁNGULO ENTRE VECTORES

Sean $\vec{u}$ y $\vec{v}$ dos vectores no nulos que tienen el mismo origen, sea θ el menor de los ángulos positivos formado por dichos vectores que satisfacen:

$$0 \leq \theta \leq \pi$$

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$$

Si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, entonces el ángulo será de 90°

Ejemplo para practicar: Halle el ángulo entre los vectores

$$a = (3; 4) \text{ y } b = (4; 3).$$

$$\text{Rpta: } \theta = \arccos \frac{24}{25}$$

Ejemplo:

Sean $\vec{a} = (4, -3)$ y $\vec{b} = (24, 7)$; determine el ángulo que forman

Resolución:

$$\cos\theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|\vec{a}\| \cdot \|\vec{b}\|} = \frac{75}{5 \cdot 25} = \frac{3}{5}$$

$$\therefore \theta = \arccos\left(\frac{3}{5}\right) = 53,1^\circ$$

DESCOMPOSICIÓN DE UN VECTOR

$$\cos \beta = \frac{3}{\|a\|} \Rightarrow \|a\| \cos \beta = 3$$

$$\sin \beta = \frac{5}{\|a\|} \Rightarrow \|a\| \sin \beta = 5$$

$$a = \|(3,5)\| (\cos \beta, \sin \beta)$$

El vector en función
de su ángulo de
inclinación

Si el vector fuera
unitario su
módulo sería 1

$$\Rightarrow \begin{aligned} \cos \beta &= 3 \\ \sin \beta &= 5 \end{aligned}$$

EJERCICIO DE APLICACIÓN

Dados los vectores en el gráfico. Halle la resultante del sistema

Como los vectores no son unitarios:

$$\vec{a} = \|\vec{a}\|(\cos 30^\circ, \sin 30^\circ) \Rightarrow \vec{a} = 4 \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2} \right) = (2\sqrt{3}, 2)$$

$$\vec{b} = \|\vec{b}\|(\cos 120^\circ, \sin 120^\circ) \Rightarrow \vec{b} = 6 \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = (-3, 3\sqrt{3})$$

$$\text{Resultante} = (2\sqrt{3}, 2) + (-3, 3\sqrt{3}) = (2\sqrt{3} - 3, 2 + 3\sqrt{3})$$

PROYECCIÓN ORTOGONAL DE UN VECTOR

La sombra que proyecta el vector $\vec{a}$ le decimos proyección

La sombra que proyecta el vector $\vec{a}$ sobre $\vec{b}$, le decimos proyección ortogonal

$$\text{Denota: } Proj_{\vec{b}}^{\vec{a}} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|\vec{b}\|^2} \cdot \vec{b}$$

COMPONENTE ORTOGONAL DE UN VECTOR

La sombra que proyecta el vector $\vec{a}$ sobre $\vec{b}$, le decimos proyección ortogonal, LA MEDIDA DE ESTE VECTOR SE CONOCE COMO LA COMPONENTE DEL VECTOR $\vec{a}$ SOBRE $\vec{b}$

$$\text{Denota: } \text{Comp}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|\vec{b}\|}$$

PROPIEDADES

$$1. - \text{Proy}_{\vec{b}}^{k \cdot \vec{a}} = k \cdot \text{Proy}_{\vec{b}}^{\vec{a}}$$

$$2. - \text{Proy}_{k \cdot \vec{b}}^{\vec{a}} = \text{Proy}_{\vec{b}}^{\vec{a}}$$

$$3. - \text{Comp}_{\vec{b}}^{k \cdot \vec{a}} = k \cdot \text{Comp}_{\vec{b}}^{\vec{a}}$$

$$4. - \text{Comp}_{k \cdot \vec{b}}^{\vec{a}} = \text{Comp}_{\vec{b}}^{\vec{a}}$$

Ejemplo:

Sean $\vec{a} = (4, -3)$ y $\vec{b} = (24, 7)$; determine el vector $Proy_{\vec{b}}\vec{a}$ y $Comp_{\vec{b}}\vec{a}$

Resolución:

- $Proy_{\vec{b}}\vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|\vec{b}\|^2} \cdot \vec{b} = \frac{75}{625} \cdot (24, 7) = \left(\frac{72}{25}, \frac{21}{25}\right)$
- $Comp_{\vec{b}}\vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|\vec{b}\|} = \frac{75}{25} = 3$

Ejemplo

- Si: $\vec{a} = (-3, -4)$; $\vec{b} = (4, 3)$; $\vec{c} = (-2, 6)$. Halle:
- $Comp_{\vec{a}} \vec{b}$
- $Proy_{\vec{c}} \vec{a}$

3 FINALMENTE

IMPORTANTE

1. Reconoce cuándo los vectores son paralelos y perpendiculares.
2. El operador ortogonal hace que el vector gire en forma antihoraria 90°
3. El producto escalar me da como resultado un escalar y no un punto.

Excelente tu participación

No hay nada como un reto para sacar lo mejor de nosotros.

Esta sesión quedará grabada para tus consultas.

PARA TI

1. Realiza los ejercicios propuestos de esta sesión.
2. Consulta en el FORO tus dudas.

Desarrolla lo que te limita

EJERCICIOS EXPLICATIVOS

Universidad
Tecnológica
del Perú

1. Sean los vectores $\vec{a} = (-2, 4)$; $\vec{b} = (3, 5)$; $\vec{c} = (3, -6)$. Determinar el valor de:
 $(\vec{b} + 2i)(3i - \vec{a}^\perp) + \vec{b} \cdot \vec{c}$

SOLUCIÓN:

$$\begin{aligned} & (\vec{b} + 2i)(3i - \vec{a}^\perp) + \vec{b} \cdot \vec{c} \\ &= ((3, 5) + 2(1, 0))(3(1, 0) - (-4, -2)) + (3, 5) \cdot (3, -6) \\ &= ((3, 5) + (2, 0))((3, 0) - (-4, -2)) + (9 - 30) \\ &= (5, 5)(7, 2) - 21 \\ &= (35 + 10) - 21 \end{aligned}$$

RPTA: = 24

$b + 2i$ significa que solo le sumo 2 a la coordenada x del vector b

EJERCICIOS EXPLICATIVOS

2. Si $\vec{a} = (4m, m - 3)$ y $\vec{b} = (2, m + 3)$ determine los valores de m tales que $\vec{a}$ es paralelo a $\vec{b}$.

SOLUCIÓN:

Esta vez usaremos
coordenadas
proporcionales
¡Observa!

$$\frac{4m}{2} = \frac{m - 3}{m + 3}$$

$$4m(m + 3) = 2(m - 3)$$

$$4m^2 + 12m = 2m - 6$$

$$4m^2 + 10m + 6 = 0$$

$$2m^2 + 5m + 3 = 0$$

$$(m + 1)(2m + 3) = 0$$

RPTA: $m = -1$; $m = -\frac{3}{2}$

EJERCICIO RETO

Sean los vectores $\vec{a} = 6j - i$; $\vec{b} = 2i + 3j$; $\vec{c} = -5i$.

Hallar:

$$(2\vec{a} \cdot \vec{c}^\perp - \vec{b} \cdot \vec{c})$$

RPTA: -50

Universidad
Tecnológica
del Perú